

PRZYGOTOWANIE DO REKTOSKOPII I ANOSKOPII ORAZ ZABIEGÓW PROKTologiczNYCH

Przygotowanie rozpoczyna się w dniu, w którym planowane jest badanie.

Należy wcześniej zaopatrzyć się w 2 szt. preparatu REKTANAL (dostępny w aptece bez recepty). Preparat ten służy do wykonania lewatywy.

Na 6 godzin przed badaniem należy wykonać lewatywę przy użyciu preparatu Rektanal.

Zabieg powtórzyć na 2 godziny przed badaniem

Jeśli badanie zaplanowano w godzinach popołudniowych można rana zjeść niewielkie śniadanie. W pozostałych przypadkach do badania należy zgłosić się na czczo.

Należy zażyć stale przyjmowane leki

UWAGA !

1. Chorzy na cukrzycę powinni w tym dniu odstawić insulinę i leki doustne i monitorować poziom glukozy glukometrem co 3 godziny !
2. Chorzy przyjmujący doustne antykoagulanty (Acenokumarol, Syncumar, Sintrom, Warfin) powinni poinformować o tym lekarza przed wykonaniem badania – w przypadku planowanego zabiegu proktologicznego należy powiadomić o tym lekarza kilka dni wcześniej !